



## РАСПОСТРАНЁННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

**М.А.Алиева**  
**К.М.Абдюсупова**  
**М.Н.Аляви**  
**Ф.Х.Шамсиев**

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников*  
[stom\\_kamola@mail.ru](mailto:stom_kamola@mail.ru)

**Цель исследования:** изучить распространённость и интенсивность заболеваний пародонта с помощью методики и карты Всемирной Организацией Здравоохранения, с использованием индекса нуждаемости в лечении CPITN.

**Материалы и методы:** Нами были обследованы 800 учащихся обоего пола в возрасте 14-15 лет и 16-17 лет, проживающих в городе Ташкенте. Регистрацию патологических изменений в тканях пародонта проводили как по методике Всемирной Организацией Здравоохранения, так и в соответствии с классификацией болезней пародонта. Состояние пародонта определяли в 6 десневых секстантах: по 3 на каждой челюсти. В каждом секстанте выявляли с помощью специального пуговчатого зонда кровоточивость дёсен, определяли наличие зубных отложений, измеряли глубину пародонтальных карманов. Состояние пародонта оценивали с применением индекса нуждаемости в лечении.

Проведенные эпидемиологические исследования и структура индекса свидетельствует о высоком уровне заболеваемости пародонта в подростковом возрасте, на что указывает незначительный процент лиц со здоровым пародонтом и наибольшее число изменённых сегментов в расчёте на одного обследованного (2,6±1,5). Из всех регистрируемых признаков патологии чаще наблюдался зубной камень, в большинстве случаев сочетавшийся с кровоточивостью дёсе (77-70%). Интенсивность этого признака составляла 3,6±2,17 сегмента на одного обследованного. Только кровоточивость дёсен без других патологических изменений в пародонте была зафиксированан у 25% подростков. Интенсивность этого признака соответствовала 1,6-4,3 сегмента на одного обследованного.

**Результаты и обсуждения:** Суммируя показатели распространённости и интенсивности отдельных признаков патологии пародонта (кровоточивость+ камень+ карманы), получили показатели общей распространённости к интенсивности заболеваний пародонта обследованного контингента населения. Распространённость болезней пародонта в подростковом возрасте составила 90,2-94% при интенсивности 4,9-5,4 поражённого сегмента на одного обследованного.

Установлено, крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта у обследованного контингента. Среднее гигиеническое значение во всех возрастных группах находилось в пределах 2,0-2,3 балла. Результаты анализа



заболеваний пародонта в подростковых группах подтверждают неуклонное прогрессирование с возрастом патологических изменений в пародонте при отсутствии соответствующих профилактических мероприятий.

**Выводы:** таким образом, показатель индекса нуждаемости в лечении свидетельствует о необходимости проведения лечебно-профилактических мероприятий среди обследованных. Так как, в удалении зубного камня или профессиональной гигиене полости рта нуждаются около 90% подростков. Это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования диагностической и лечебно-профилактической помощи данному контингенту населения.